



Химиотерапия и инвалидность

Получение статуса инвалида после завершения радикального лечения онкологического заболевания не является обязательным вариантом. Инвалидность, как и время пребывания на больничном, свидетельствует о временной нетрудоспособности, но на более продолжительный срок.

Важно осознать, что статус инвалида выдается не на всю оставшуюся жизнь, а только на период сложной терапии и последующего восстановления. Группу инвалидности без права на работу могут предоставить на год, а затем ее могут снять через год-два при отсутствии рецидива заболевания, либо перевести в «рабочую» 3-ю группу.

Если у пациента до достижения пенсионного возраста остается менее двух лет, он может претендовать на досрочную и пожизненную пенсию по инвалидности. Более молодым приходится возвращаться к трудовой деятельности, что может быть непросто после получения статуса «бывшего» инвалида. Перед принятием решения о подаче на группу инвалидности стоит тщательно обдумать все аспекты данного шага.



Как долго длятся токсические эффекты химиотерапии

Продолжительность проявления токсических эффектов зависит от скорости восстановления поврежденной ткани. Обычно стандартное время восстановления составляет около 21 дня. За этот период полностью восстанавливаются кишечная слизистая и костный мозг. Для восстановления уровня лейкоцитов и тромбоцитов достаточно примерно недели, тогда как восстановление эритроцитов может занять более 4 месяцев.

Мукозиты могут продолжаться до нескольких недель, но уже к концу первой недели симптомы становятся менее выраженными. Восстановление функций печени, почек и нервной системы может потребовать до года, но без гарантии полного восстановления. Новый рост волос начинается примерно к старту следующего цикла химиотерапии, тогда как полная смена ногтей происходит в течение примерно полугода.

8 (3022) 200-300

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ул.Бабушкина, 97
8 (3022) 200-300



Частые вопросы о химиотерапии


Ответы на эти вопросы помогут вам проще перенести период химиотерапии и откроют вам самое важное – что жить нужно и можно полноценно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что делать после химиотерапии?

По завершении курса важно продолжать жить полноценной жизнью, не оставаясь в прошлом и не позволяя болезни определять свой образ жизни. Возможно, потребуется дальнейшее наблюдение и реабилитация, как физическая, так и психологическая.

Активный образ жизни после окончания химиотерапии является ключом к успешному восстановлению. Возвращение к работе и занятия любимыми делами помогают отвлечься от негативных воспоминаний и трудностей периода лечения.



Беременность после химиотерапии

Цитостатическая терапия не способствует репродукции и во время лечения беременность практически исключается. Ремиссия рака не совсем подходящее время для продолжения рода. После завершения химиотерапии беременность должна быть не только плановой, но и продуманной, следует помнить, что рак – хроническое заболевание, о полном излечении можно говорить по прошествии десятилетия. Молодым женщинам рекомендуется контрацепция. Адекватный способ предохранения предложит гинеколог, специализирующийся на онкологической патологии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Секс после химиотерапии

Секс разрешен, противопоказаний нет, если купированы токсические реакции химиотерапии. При молочнице и других неблагоприятных симптомах со стороны слизистой оболочки половых путей – наследии противоопухолевого лечения у женщины, о перспективах возвращения к половой жизни необходимо посоветоваться с гинекологом.

Химиотерапия неблагоприятно сказывается на потенции, но с течением времени эректильная дисфункция должна пройти, но лучше обсудить проблемы с андрологом-урологом, сегодня выпускается достаточно средств для купирования временных проблем интимной жизни.

Месячные после химиотерапии

Средний срок восстановления менструального цикла после завершения последнего цикла химиотерапии — 6 месяцев, но до первых месячных может пройти и существенно меньший срок, всё зависит от гормонального возраста женщины. У входящих в климактерический период женщины лекарственная аменорея может плавно перетечь в постменопаузу без менопаузы — последней менструации.

Продолжительность жизни

Продолжительность жизни онкологического больного определяется течением злокачественного процесса. Несмотря на устойчивый миф о высокой частоте смертности «от химиотерапии», от токсичности погибает ничтожно малое число пациентов. Подавляющее большинство онкобольных умирает от прогрессирования заболевания, когда объем опухолевых масс уже не совмещается с продолжением человеческой жизни. Наблюдательные исследования доказали большую частоту сердечно-сосудистых болезней и вероятность развития вторых злокачественных процессов через несколько десятилетий после лечения рака, но пока нет доказательств, что противоопухолевая терапия сокращает жизнь излечившихся от первичного злокачественного процесса.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА